

三门峡哪里有驴养殖厂

发布日期: 2025-09-24

驴结核病原为驴分支杆菌。病畜是主要传染源，可由呼出的气体、唾液、鼻液、痰液、粪、尿、乳汁和阴道分泌物排菌和污染周围环境。该病主要通过呼吸道、消化道，也可通过交配传播，其中经呼吸道传染的威胁比较大。人类多因驴分支杆菌或结核分支杆菌而致病，其途径主要是食入未经检疫的畜产品，尤其是饮用未经巴氏消毒或煮沸的患有结核病驴的奶而经消化道*，特别是幼儿驴分支杆菌者多。另外，经常与患结核病驴接触的人员(畜牧兽医工作者，挤奶人员，饲养人员等)，由于病畜的咳嗽可经呼吸道。因此，为防止人的接触，除了对畜产品，尤其是乳要严格遵守卫生检验制度外，还必须加强检疫、预防工作，对该病采取严格的控制、扑灭措施，及时发现和处理，彻底净化驴群. 如何提早肉驴养殖出栏时间。三门峡哪里有驴养殖厂

注意天气，确保安全放牧驴群，要注意天气，秋后还有一伏，天热时要顶风放牧，但要防止阳光直射驴眼，避免日射的应激反应。一早一晚或深秋天凉时要顺风放牧，有利于驴体保温。下雨天不要放牧，有露水或雨天都不要放牧豆科多的牧草；下霜后更不要放牧霜露草，防止驴急性胀肚。秋收后遛秋茬时，不要放牧玉米苗、高粱苗或再生的麦苗等，防止驴氢氰酸中毒。同时，不要到低洼的草地放牧，也不要饮泡子水或坑内的死水，防止得寄生虫病，以确保驴的健康和安全生产。三门峡哪里有驴养殖厂搞好饲舍卫生，圈厩内不留隔夜粪便。

不失时机地抓好秋膘，充分利用草地，既能省去打草和运输，又能使产奶驴和孕驴得到充分运动和多晒太阳，增强体质。青草中的矿物质、维生素和蛋白质等营养丰富，尤其秋后的草已大多扬花打子，含有的糖和油脂也多，使驴容易吸收，上膘快抓紧秋牧，早出晚归、进入深秋，放牧时间不够用，应抓紧一早一晚放牧，中午不回圈舍休息，以延长放牧时间，没下霜前要早出晚归，下霜后要晚出晚归，使驴吃好。秋后由于天气转凉，牧草枯萎，营养也差，驴吃不饱，满足不了需要，晚归后，都要补料，比平时要增加10~20，以满足畜体和产奶产肉的营养需要。

灭养驴场内有害昆虫和老鼠等野生动物，消灭疫病传染源，切断其传播途径是控制驴场传染性疾病的又一重要措施。常利用化学杀虫剂(如溴氰菊酯、敌敌畏、双甲脒等)对驴舍内进行大面积喷洒，向场区内外的蚊蝇栖息地、滋生地进行滞留喷洒。门窗安装防蚊蝇设施。控制鼠害，应动员全场职工人人动手，采用坚壁清野的方法，使鼠类难以获取食物，挖毁其室外的巢穴，填埋、堵塞室内鼠洞，用烟熏杀洞中老鼠，达到彻底驱杀的目的，与此同时，利用有效杀鼠药，在专区内外大面积投放。但要注意投放位置，药物不要伤及场内肉驴. 公母混养的圈厩，要注意分离。

不是说驴不得病，只不过驴病比较少而已，比较常见的就是疥螨、拉稀、发烧、结症这几个是比较常见的，其他像脑炎、腐蹄病、脱肛等都是有的。这就是需要注意一定要回诊断驴病，前

期做好卫生工作，药品要必备。不懂要先咨询养驴的朋友切记咨询兽医，兽医不是养驴很少了解驴一些特性。育肥出栏快见效快，繁殖见效慢周期长收益高，但是育肥需要的是量，数量少几乎是利润比较薄，所以相对繁殖投资比较大，尤其前期可能对于场地建设或许和其他设施投资比较大，一定要规划好。科学的饲喂方法是提高饲料利用率的有效方法。三门峡哪里有驴养殖厂

所选的饲料不同，出栏时间也就不同。三门峡哪里有驴养殖厂

农户饲养肉驴比较好选择中型驴，次之为大型驴，而小型驴多为制阿胶用，其肉也可投放市场。一般以良种驴改良本地驴，用其杂交后代培养的肉驴是比较好的选择。肉驴的品种选择要求主要有以下三点具体要求：(1)生长发育迅速，可使育肥进程加快，饲养效益提高。(2)体型要大，可多长肉，屠宰率利用率高。(3)体格要健壮，蹄小而坚实，抗病力强，遗传性好。新购进的成年驴或是淘汰的役驴，可先饲喂易消化的干、青草和鼓皮。经过几天观察后，待其表现正常后，再饲喂混合饲料。粗料以棉籽壳、玉米秸粉、谷草、豆荚皮或以其它各种青、干草为主；精料以棉籽饼（豆饼、花生饼）50%、玉米面（大麦、小米）30%，鼓皮（豆渣）20%配合成。饲喂时要少喂勤添，饮足清水，适量补盐。三门峡哪里有驴养殖厂

上蔡县润康牧业有限公司致力于农业，是一家生产型的公司。公司业务涵盖驴，马，牛，羊等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于农业行业的发展。润康牧业秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。